

Vacunación antigripal 2021



Ministerio de Salud
Argentina

Dirección de
Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles

Marzo de 2021

LINEAMIENTOS TÉCNICOS

Vacunación Antigripal

GUÍA OPERATIVA

2021

Dirección de
Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles



Ministerio de Salud
Argentina



Argentina unida

salud



Agentes inmunizantes

Viraflu®: una dosis de 0,5 mL (vacuna trivalente: TIV)

Viraflu® Pediátrica: una dosis de 0,25 mL (vacuna trivalente pediátrica TIVp)

Fluxvir®: una dosis de 0,5 mL (vacuna trivalente adyuvantada: aTIV)

Cepas

A/Victoria/2570/2019 (H1N1)
A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)
B/Washington/02/2019 (linaje B/Victoria)


Adyuvante

MF59C.1 (mejor respuesta >65 años)



Población objetivo	Acciones
Personal de salud / estratégico	Aplicar una dosis de 0,5 mL de vacuna antigripal. En menores de 65 años se utiliza Viraflu y en \geq 65 años preferentemente Fluxvir.
Embarazadas	Aplicar una dosis de 0,5 mL de Viraflu® en cualquier momento de la gestación.
Puérperas	Aplicar una dosis de 0,5 mL de Viraflu® Hasta el egreso de la maternidad -máximo 10 días-, si no recibió la vacuna durante el embarazo.
Niños y niñas de 6 a 24 meses inclusive*	Aplicar dos dosis de 0,25 mL de vacuna antigripal Viraflu pediátrica® separadas por un mes
Niños y niñas de 25 a 35 meses inclusive con factores de riesgo*	Los niños que hubieran recibido dos dosis de vacuna antigripal anteriormente deberán recibir solo una dosis.
Niños y niñas mayores de 36 meses a 8 años inclusive, con factores de riesgo*	Aplicar dos dosis de 0,5 mL de vacuna antigripal Viraflu®. Los niños que hubieran recibido dos dosis de vacuna antigripal anteriormente deberán recibir solo una dosis.
Niños y adultos de 9 años a 64 años inclusive con factores de riesgo	Aplicar una dosis de 0,5 mL de vacuna antigripal Viraflu®
Adultos mayores o igual de 65 años	Aplicar una dosis de 0,5 mL de vacuna antigripal, preferentemente adyuvantada - Fluxvir®





DiCEI

5.300.000

1.500.000

1.500.000

PAMI

200.000

1.100.000





COADMINISTRACIÓN CON OTRAS VACUNAS

Al momento de la realización del presente documento, la coadministración de las vacunas contra la COVID-19 con otras vacunas del Calendario Nacional no ha sido evaluada. Por este motivo, y hasta tanto se tenga más información al respecto, se recomienda respetar un intervalo de 14 días con la aplicación de otras vacunas, incluida la vacuna antigripal.

En el caso de haberse aplicado simultáneamente con la vacuna contra COVID- 19 o con un intervalo menor a 14 días, deberá realizarse la notificación correspondiente del ESAVI, y no está indicado aplicar nuevamente ninguna de las vacunas administradas.

VACUNACIÓN EN PACIENTES CONFIRMADOS O SOSPECHOSOS DE COVID-19

Si bien no existen contraindicaciones médicas para administrar vacunas (incluida vacuna antigripal) en pacientes con diagnóstico de COVID-19, se recomienda posponer la vacunación con el objetivo de evitar la transmisión viral y propagación de la enfermedad, en las siguientes situaciones:

- ✓ casos confirmados: vacunar luego de 14 días de la fecha de inicio de los síntomas o bien hasta la recuperación clínica.
- ✓ contactos de casos confirmados: vacunar luego de completar los 14 días de aislamiento



REGISTRO DE DOSIS APLICADAS

El registro deberá ser nominal y el monitoreo se hará desde NOMIVAC

AVANCE DE META SEMANAL (corte lunes 12 hs.)

- I. Registro en NOMIVAC directo** por medio del FAD, App NOMIVAC y Formulario tradicional
- II. Registro en línea en sistemas provinciales:** las jurisdicciones que utilizan RNVe (Registro Nominal de Vacunación electrónico) propios, notificarán a NOMIVAC por medio del servicio web disponible (interoperabilidad).
- III. Registro en planilla papel:** se realizará en la planilla papel nominal generada por la **DiCEI**. Pueden ser enviadas a un nodo cercano para su ingreso al NOMIVAC o RNVe (Registro Nominal de Vacunación electrónico) provincial si el ingreso en tiempo real no fuera posible.

POBLACIONES

	Cálculo de población	Cálculo de coberturas
PERSONAL DE SALUD	Misma población que vacuna COVID	SI
EMBARAZADAS	75% de NV	SI
PUÉRPERAS	25% de NV	NO
NINXS de 6 a 24 meses	NV x 1.5	SI
2 a 64 años con FR	NV x 63 x 0.1 (10%)	NO
65 años y mayores	???	???



POBLACIONES: Personas de 65 años y mayores

Proyecciones del INDEC 2021	5.353.272
75% de esa población	4.014.954
Dosis entregadas al PAMI	1.100.000
Total dosis aplicadas 2019	1.281.894
Total dosis aplicadas 2020	2.472.828 (46% INDEC/62%)
Promedio 2019/2020	1.877.361 (35% INDEC/46%)

Que población contemplamos?

Se sugiere promedio aplicadas 2019/2020



Estrategia de vacunación antigripal

Se priorizará vacunación de grupos no pertenecientes a vacunación COVID y/o ya vacunados como embarazadas, niñas y niños, personal de salud y personas > 65 años ya vacunadas

Considerar que la vacunación antigripal debe estar separada por 14 días de cualquier vacuna contra la COVID. En el caso de COVISHIELD (intervalo de 8 a 12 semanas) se puede aplicar vacuna antigripal entre la primera y segunda dosis.



Ministerio de Salud
Argentina