


Viedma, 19 de marzo del 2021

VACUNA ANTI - SARSCOV 2
**RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CURSANDO PATOLOGÍA ONCO-
HEMATOLÓGICA**
INFORMACIÓN PARA PACIENTES

En estos casos se requiere consulta con personal médico, teniendo en cuenta varios aspectos:



DISPONIBILIDAD DE VACUNAS: Es escasa por lo que se reserva a las personas con **patologías de riesgo** y personal de salud, no pudiendo aplicarse a familiares sanos/as.

SEGURIDAD: Este grupo de pacientes **NO** puede recibir vacunas virales replicativas o atenuadas. A la fecha ninguna de las vacunas disponibles en nuestro País utiliza ese **mecanismo de acción**. Recientemente Argentina incorporó la vacuna Sinopharm (fabricada en China) de plataforma viral inactivada, sólo para personas de 18-59 años con factores de riesgo, que **NO** presenten:

- Trastornos de coagulación y trombocitopenia
- Epilepsia no controlada o trastorno neurológico progresivo

LAS VACUNAS A VIRUS VIVO ATENUADO Y DE VECTOR VIRAL REPLICATIVO SE ENCUENTRAN CONTRAINDICADAS EN PACIENTES INMUNOSUPRIMIDOS.

ESTAS VACUNAS NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES A LA FECHA, EN ARGENTINA

INMUNOGENICIDAD / EFICACIA:

- La respuesta vacunal puede ser reducida, por lo tanto es primordial **continuar evitando exposición al virus SARSCOV2**, manteniendo distanciamiento social, higiene de manos, uso correcto de tapabocas y ventilación e higiene de ambientes.
- **No se recomienda el dosaje de anticuerpos** previamente o posterior a la vacunación.
- La vacuna **solo previene formas graves**, no evita el contagio ni formas leves o moderadas de COVID-19, por lo que ante la presencia de síntomas compatibles debe realizarse la consulta precoz, hisopado es y aislamiento correspondientes.
- **Aquellas personas que tuvieron infección por SARCOV- 2 deben vacunarse**, dado que se desconoce la duración de la inmunidad viral y pueden re-infectarse.

MOMENTO: Si la patología se encuentra controlada, requiriendo solo chequeos, y **no recibe medicación inmunosupresora, puede vacunarse sin consulta médica previa.**

De lo contrario su médica/o deberá considerar el momento de mejor respuesta acorde al estadio de enfermedad, tratamiento que recibe, recuento de linfocitos, etc.

La vacunación deberá *posponerse en caso de fiebre o descompensación de enfermedad de base* hasta ser evaluado por personal médico.

No se recomienda posponer la terapia de inducción de Leucemias y Linfomas para recibir la vacuna, sino extremar medidas de prevención.

La vacunación antigripal y otras vacunas debe separarse 14 días de la vacuna anti-SARSCOV-2.

En caso de recibir vacuna Covishield cuyo intervalo entre ambas dosis es de 8 a 12 semanas, vacunarse contra la gripe y neumonía entre la primera y segunda dosis.

**LA INSCRIPCIÓN PARA VACUNARSE SE REALIZA POR VÍA WEB
NO REQUIERE ORDEN MÉDICA**

Ante cualquier duda no dude en consultar!

EQUIPO IMO VIEDMA