


Viedma, 19 de marzo del 2021

## VACUNA ANTI - SARSCOV 2

### RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CURSANDO PATOLOGÍA ONCOLÓGICA

#### TUMORES SÓLIDOS

Existen cuatro aspectos a considerar:



**DISPONIBILIDAD DE VACUNAS:** Es escasa por lo que se reserva a las **personas con patologías de riesgo y personal de salud**, no pudiendo aplicarse a familiares sanos/as.

**SEGURIDAD:** A la fecha **ninguna de las vacunas disponibles en Argentina contiene virus vivo**. Por lo tanto se consideran seguras.

Recientemente nuestro País incorporó la vacuna **Sinopharm** (fabricada en China) de plataforma **viral inactivada**, sólo **para personas de 18-59 años con factores de riesgo**, que **NO** presenten:

- **Trastornos de coagulación y trombocitopenia**
- **Epilepsia no controlada o trastorno neurológico progresivo**

**INMUNOGENICIDAD / EFICACIA:** Las personas que **reciben tratamiento oncológico** pueden vacunarse (excepto RITUXIMAB). Pero es importante recalcar que la respuesta vacunal puede ser **reducida**, por lo tanto **deben continuar evitando exposición al virus SARSCOV2**, manteniendo distanciamiento social, higiene de manos, uso correcto de tapabocas y ventilación e higiene de ambientes.

**No se recomienda el dosaje de anticuerpos** previamente o posterior a la vacunación.

**La vacuna solo previene formas graves, no evita el contagio, ni formas leves o moderadas** de COVID-19, por lo que ante la presencia de síntomas compatibles, debe realizarse la consulta precoz, hisopado y aislamiento correspondientes.

Aquellas personas que **tuvieron infección por SARCOV- 2 deben vacunarse** dado que se desconoce la duración de la inmunidad viral y pueden re-infectarse.

**MOMENTO:** Se sugiere iniciar la vacunación lo antes posible. Si se encontrara en quimioterapia activa vacunarse entre los 3 a 5 días antes del tratamiento.

La vacunación deberá *posponerse en caso de fiebre o descompensación de enfermedad de base* hasta ser evaluado por personal médico.

**La vacunación antigripal y otras vacunas debe separarse 14 días de la vacuna anti-SARSCOV-2.**

En caso de recibir vacuna Covishield cuyo intervalo entre ambas dosis es de 8 a 12 semanas, vacunarse contra la gripe y neumonía entre la primera y segunda dosis.

Ante cualquier duda no dude en consultar!

LA INSCRIPCIÓN PARA VACUNARSE SE REALIZA POR VÍA WEB  
NO REQUIERE ORDEN MÉDICA

**EQUIPO IMO VIEDMA**